



hae  
day :-)

MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

知っていますか？

すべての浮腫がアレルギーに  
よる浮腫とは限りません。

遺伝性血管性浮腫 (HAE) では次のような  
症状を生じます

- 浮腫、むくみ
- 腹痛
- 気道の詰まり(息苦しさ)
- HAEの症状はアレルギー反応として誤  
診されることがしばしばあります。



MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

知っていますか？

## 遺伝性血管性浮腫 (HAE) は 早期診断が大事です。

HAEは多くの場合血液検査で簡単に  
診断できます。

しかし、まれな疾患で他の疾患ととても  
症状が似ているため、診断までに時  
間がかかることが多く、10年以上かか  
ることもあります。





MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

知っていますか？

遺伝性血管性浮腫 (HAE) は  
遺伝的な病気です。

50 %の確率で親から子に遺伝します。  
親とは関係なく突然変異によりHAEの遺伝  
子を持って生まれることもあります。



The logo consists of two overlapping circles. The top circle is purple and contains the text "hae day :-)" in white. The bottom circle is blue and contains the text "MANY FACES ONE FAMILY" in white.

hae  
day :-)

MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

知っていますか？

ストレスは遺伝性血管性  
浮腫 (HAE) の発作を起こ  
すきっかけになります。

不安、ストレス、軽い打身、手術、風  
邪やインフルエンザなどでも発作が  
起こります。



The logo consists of two overlapping circles. The top circle is purple and contains the text "hae day :-)" in white. The bottom circle is blue and contains the text "MANY FACES ONE FAMILY" in white.

hae  
day :-)

MANY FACES  
ONE FAMILY

Join us in celebrating **hae day :-)** on 16 May!

知っていますか

アレルギー反応を抑える薬  
は遺伝性血管性浮腫 (HAE)  
には効きません。

C1 インヒビター (C1-INH) の量や機能が低いとブラジキニンが過剰に作られます。抗ヒスタミン薬やステロイド薬などのアレルギー治療薬はHAEには効果がありません。

